

Transmucosal Buprenorphine Consent Form, Portuguese Translation

CONSENTIMENTO PARA TRATAMENTO COM BUPRENORFINA TRANSMUCOSA

A buprenorfina é uma medicação aprovada pela FDA para o tratamento de pessoas com transtorno de uso opioide. Buprenorfina está disponível em formações de comprimido, filme e injetáveis. As formas de comprimidos e filmes do medicamento são mais comuns, disponíveis como uma combinação de dois medicamentos, buprenorfina e naloxona. O comprimido apenas de buprenorfina normalmente é reservado para mulheres grávidas.

A buprenorfina demonstrou ser uma medicação segura e eficaz para tratamento a longo prazo do transtorno de uso opioide. No entanto, como a buprenorfina é uma medicação opioide, o uso contínuo do medicamento resultará em dependência física. A retirada da buprenorfina é geralmente menos intensa do que a retirada da heroína ou metadona. Se a buprenorfina for descontinuada repentinamente, os pacientes podem ter sintomas leves de retirada, enquanto outros podem ter sintomas mais graves, como dores musculares, cólicas estomacais ou insônia com duração de vários dias a semanas. Para minimizar a possibilidade de retirada de opioide, a buprenorfina deve ser descontinuada gradualmente e com o apoio da equipe de tratamento.

A combinação de buprenorfina com álcool ou medicamentos sedativos, como os benzodiazepínicos, pode ser perigoso e resultar em sobredosagem ou morte. Recomenda-se discutir todas as suas mediações com sua equipe de saúde.

Comprimidos/filmes de buprenorfina **devem** ser mantidos debaixo da língua até que o medicamento se dissolva completamente. A buprenorfina não será absorvida do estômago se for ingerido. Abstenha-se de comer, beber e fumar até 15 minutos depois de tomar a medicação.

Se você for dependente de opioides, como fentanil ou metadona, deve realizar a retirada máxima possível que você consegue tolerar quando tomar sua primeira dose de buprenorfina. Estar em retirada garante que o opioide usado anteriormente seja menos provável de interagir com o medicamento. Se você não estiver em retirada, a buprenorfina pode causar rapidamente a retirada grave de opioides.

Pode levar vários dias para fazer uma transição confortável do opioide que você estava tomando para a buprenorfina. Depois de estabilizar a buprenorfina, o uso de outros opioides terá menos efeito. As tentativas de substituir a buprenorfina com mais opioides podem resultar em uma sobredosagem.

Nome legível

Assinatura

Data

Testemunha

Data

This document has been reproduced with permission from Boston Medical Center© and is excerpted from: Wason, K.F.; Potter, A.L.; Alves, J.D.; Loukas, V.L.; Lastimoso, C.S.; Sodder, S.B.; Caputo, A.M.; and LaBelle, C.T. Massachusetts Nurse Care Manager Model of Office Based Addiction Treatment: Clinical Guidelines. Unpublished treatment manual, Boston Medical Center, May 2021. This manual or any documents therein are not a substitute for informed medical decision making by an appropriate, licensed provider.