

Consent for Treatment with Naltrexone, Haitian Creole Translation

KONSANTMAN POUT RETMAN AVÈK NALTREXONE

Naltrexone Oral ak Naltrexone Enjektab Ki Genyen Liberasyon Pwolonje

Naltrexone se yon medikaman ki apwouve pa FDA a pou prevni retou nan itilizasyon opyoyid ak pou trete twoub konsomasyon alkòl. Terapi antretyen avèk naltrexone ka kontinye depi li medikalman nesesè, sa ki soti nan tretman ki dire kèk mwa jiska tretman ki dire tout lavi.

Ou pa dwe kòmanse naltrexone si w ap itilize opyoyid oswa si w ap fè fas ak sevraj nan opyoyid yo. Rekòmandasyon jeneral la se pou evite tout opyoyid pandan 7-10 jou anvan ou kòmanse tretman naltrexone pou evite tonbe malad. Depistaj toksikoloji nan pipi pral fèt anvan chak enjeksyon pou asire abstinans de opyoyid yo.

Lefètke naltrexone pa yon opyoyid, ou p ap genyen okenn tolerans ak opyoyid pandan tretman an. Sa vle di ke si ou t ap itilize opyoyid anvan naltrexone, ou **pral** plis sansib ak dòz opyoyid ki pi fèb yo nan yon **risk ki ogmante pou òvèdòz ak domaj oswa lanmò ki lye ak òvèdòz** si ou ta rekòmanse yon itilizasyon opyoyid.

Li rekòmande pou alète fanmi w, zanmi w, oswa kontak pwòch ou yo ke w ap pran naltrexone epi konsènan risk yon òvèdòz si ou ta retounen nan itilizasyon opyoyid.

Akoz naltrexone ki genyen liberasyon pwolonje se yon enjeksyon, yo pa ka retire l nan kò a. Pou asire ke ou ka tolere medikaman an, pasyan ki pa te janm pran naltrexone dwe kòmanse avèk yon dòz nan bouch (fòm konprime). Si ou ka tolere konprime a byen, ou kapab chanje vin nan fòmilasyon enjektab.

Kapab genyen yon reyakson nan sit enjeksyon an. Reyakson an ka grav. Li enpòtan pou resevwa swen medikal pou reyakson ki agrave oswa reyakson ou pa sèten de yo, ki genyen ladan gwo doulè, anflamasyon, chalè oswa woujè, zanpoud, sansasyon ke zòn nan di oswa li fè boul, oswa ouvèti po.

Chèche swen medikal an ijans si ou devlope siy/sentòm nemoni ki genyen ladan souf kout, respirasyon siflan, lafyèv, ak difikilte pou respire. Kapab genyen vètij tou pandan tretman avèk naltrexone lan. Evite kondwi ak itilize machin ki lou oswa machin ki danje jiskaske ou sèten konsènan fason naltrexone afekte w.

Tès laboratwa pou kontwole fonksyon fwa a pral fèt anvan ak pandan tretman an, paske naltrexone ka afekte fwa w. Kontakte founisè ou an touswit si ou devlope sentòm pandan tretman tankou zye/po k ap vin jòn, pipi fonse, doulè nan lestomak, pèt apeti, fatig, ak chanjman nan poupou (ki genyen ladan devlopman dyare).

Ou kapab fè fas ak depresyon pandan ou sou naltrexone. Si ou devlope depresyon, li enpòtan pou di yon moun sa epi/oswa alète founisè medikal ou yo. Si ou santi tankou ou anvi fè tèt ou mal oswa yon lòt moun mal, ale nan sal dijans lokal ou an oswa rele 911. Ou dwe pote avèk ou enfòmasyon alèt yo pou lòt moun ka konnen ou sou naltrexone nan yon ijans medikal, tankou yon kolye alèt medikal, braslè, ak/oswa kat ijans.

Pasyan ki ka vin ansent yo: yo pral fè yon tès gwosè s pou yo anvan yo kòmanse tretman naltrexone nan. Si ou aprann nenpòt lè ke ou ansent, tanpri alète ekip medikal ou an.

Si ou bezwen jesyon doulè avèk medikaman opyoyid yo nan yon sitiayson medikal dijans, li enpòtan pou ekip medikal ou an konnen ke w ap pran naltrexone. Ou bezwen jesyon medikal nan men founisè ki fòme nan itilizasyon medikaman analjezik ak jesyon efè respiratwa potansyèl. Pote enfòmasyon kontak dijans yo avèk ou tout tan, epi fè kontakte ekip OBAT ou an si nesesè pou ede nan swen ou an.

Naltrexone se sèlman yon pati nan tretman ou an. Li rekòmande pou chèche sèvis soutyen pou retablisman, ansanm ak pati medikal nan tretman ou an, pou ede w nan pwoesisis retablisman ou an.

Non Pasyan an

Dat

Non Founisè a

Dat

This document has been reproduced with permission from Boston Medical Center© and is excerpted from: Wason, K.F.; Potter, A.L.; Alves, J.D.; Loukas, V.L.; Lastimoso, C.S.; Sodder, S.B.; Caputo, A.M.; and LaBelle, C.T. *Massachusetts Nurse Care Manager Model of Office Based Addiction Treatment: Clinical Guidelines*. Unpublished treatment manual, Boston Medical Center, May 2021. This manual or any documents therein are not a substitute for informed medical decision making by an appropriate, licensed provider.
