

Consent for Treatment with Disulfiram, Portuguese Translation

CONSENTIMENTO PARA TRATAMENTO COM DISULFIRAM

Disulfiram (Antabuse) é um medicamento aprovado pela FDA para tratar distúrbios de consumo de álcool em indivíduos que pararam o consumo de álcool. Este medicamento faz com que o corpo não consiga processar álcool. Quando álcool é consumido, ocorre uma reação dependente da dose. Disulfiram NÃO deve ser tomado se você tiver consumido álcool nas últimas 12 horas.

Quanto maior a quantidade de álcool consumida, mais forte é a reação de disulfiram-álcool. A reação pode durar de 30 minutos a várias horas, ou o tempo que levar para que o álcool seja metabolizado. Uma reação de disulfiram-álcool pode ocorrer por até 2 semanas depois de parar com o medicamento.

Uma reação de disulfiram-álcool pode incluir dificuldades para respirar, dor na cabeça e pescoço, náusea, vômito, suor, sede, palpitações, fraqueza, tontura, visão borrada e confusão. Reações graves podem envolver paradas respiratórias, paradas cardíacas, perda de consciência, convulsão e morte.

Até mesmo pequenas doses de álcool podem ser absorvidas de perfumes, higienizadores para mãos, alimentos (molhos, vinagres, marinadas, extratos, etc.), e bebidas alcoólicas, causando uma reação de disulfiram-álcool. É importante verificar os rótulos dos itens que serão consumidos.

Exames de laboratório para monitorar a função hepática serão realizados antes e durante o tratamento, pois disulfiram pode afetar o seu fígado. Entre em contato imediatamente com seu médico se você desenvolver sintomas, como amarelamento dos olhos/pele, urina escura, dor estomacal, perda de apetite, fadiga e mudança nas fezes (inclusive o desenvolvimento de diarreia).

O efeito colateral mais comum de disulfiram é tontura, mas reações adversas graves já ocorreram em indivíduos, inclusive problemas hepáticos, irritação dos nervos/neuropatia, psicose, acne, erupções cutâneas, impotência e inflamação do nervos óptico.

Há alguns medicamentos que não devem ser tomados com disulfiram (metronidazol, dronabinol, e alguns medicamentos para tosse). É importante avisar os médicos que você está tomando disulfiram. Não mude as medicações sem consultar o seu médico.

Não se sabe se disulfiram é seguro durante a gravidez ou se pode ser passado no leite materno. Um exame de gravidez será feito antes de começar o tratamento. Se você descobrir que está grávida, alerte sua equipe médica. Disulfiram não é recomendado durante a amamentação.

Armazene o disulfiram em temperatura ambiente, em um recipiente resistente à luz. Mantenha todos os medicamentos longe do alcance de crianças e animais de estimação.

O consumo de álcool é muito perigosos depois de iniciar o tratamento com disulfiram. Recomenda-se alertar a sua família, amigos e contatos próximos que você está tomando disulfiram e sobre o risco de uma reação grave caso tenha um retorno ao uso.

Disulfiram é somente uma parte do tratamento. Recomenda-se buscar serviços de apoio à recuperação juntamente com a parte médica do seu tratamento, para ajudá-lo no processo de recuperação.

Nome do paciente

Data

Nome do profissional

Data

This document has been reproduced with permission from Boston Medical Center© and is excerpted from: Wason, K.F.; Potter, A.L.; Alves, J.D.; Loukas, V.L.; Lastimoso, C.S.; Sodder, S.B.; Caputo, A.M.; and LaBelle, C.T. Massachusetts Nurse Care Manager Model of Office Based Addiction Treatment: Clinical Guidelines. Unpublished treatment manual, Boston Medical Center, May 2021. This manual or any documents therein are not a substitute for informed medical decision making by an appropriate, licensed provider