



## Hoja de información para pacientes de BRIXADI®

Este folleto proporciona información sobre BRIXADI®, una formulación inyectable de buprenorfina. Léalo y comuníquelo a su proveedor cualquier duda que tenga.

**¿Qué es BRIXADI® y cómo funciona?** BRIXADI® es una inyección de buprenorfina de acción prolongada que se utiliza para tratar el trastorno por consumo de opiáceos. La inyección está disponible en dos formulaciones: semanal y mensual.

BRIXADI® semanal se administra cada 7 días	Dosis semanales: 8mg, 16mg, 24mg, 32mg
BRIXADI® mensual se administra cada 28 días	Dosis mensuales: 64mg, 96mg, 128mg

- BRIXADI® le proporciona una semana o un mes completo de medicación en una sola inyección al liberar continuamente el medicamento durante toda la semana o el mes a niveles constantes, sin altibajos diarios. Su equipo de atención médica trabajará con usted para determinar la formulación y la dosis adecuadas para usted.

### ¿Qué debo hacer antes de comenzar con BRIXADI®?

- Antes de comenzar con BRIXADI®, debe ser capaz de tolerar al menos UNA dosis de 4 mg de buprenorfina transmucosa O estar tomando buprenorfina actualmente.
- Si actualmente no está tomando buprenorfina, deberá empezar con BRIXADI® de forma semanal.
- Si ya está tomando buprenorfina, puede empezar con BRIXADI® de forma semanal o mensual.
- Si actualmente consume opiáceos y no toma buprenorfina, colabore con su proveedor para empezar primero con las láminas o las pastillas de buprenorfina para evitar un síndrome de abstinencia precipitado antes de recibir la inyección.

### ¿Cómo recibiré las inyecciones de BRIXADI®?

- El médico le administrará BRIXADI® en forma de inyección subcutánea (bajo la piel) en la nalga, el muslo, el estómago (abdomen) o el brazo.
- BRIXADI® se inyecta en forma de líquido que forma un bulto bajo la piel denominado depósito. Durante unas semanas, es posible que vea o sienta un pequeño bulto bajo la piel en el lugar de la inyección, que puede reducirse con el tiempo. No intente quitar el depósito.

### ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de BRIXADI®?

Como cualquier medicamento, BRIXADI® puede causar efectos secundarios. Los efectos secundarios más frecuentes son los siguientes:

- Dolor de cabeza
- Estreñimiento
- Náuseas
- Problemas para dormir (insomnio)
- Infección del tracto urinario

**Las reacciones adversas en el lugar de la inyección suelen ser de leves a moderadas. No obstante, póngase en contacto con su equipo médico inmediatamente si experimenta un aumento del dolor, enrojecimiento, cambios en la piel o ardor/picazón en el lugar de la inyección, ya que esto puede justificar una evaluación adicional.**

Póngase en contacto con su equipo médico o busque atención médica inmediatamente si cree que puede estar experimentando algún efecto secundario grave, como dificultad para respirar, somnolencia, mareos o problemas de coordinación, problemas hepáticos (orina oscura, piel/ojos amarillos, dolor abdominal), reacción alérgica, síndrome de abstinencia de opiáceos o presión sanguínea baja.

### ¿Cuál es la información de seguridad importante que debo conocer sobre BRIXADI®?

**BRIXADI® no debe inyectarse nunca en una vena porque podría causar daños graves o incluso la muerte. Los pacientes nunca deben manejar este medicamento.** La muerte o los daños graves pueden ocurrir si toma ansiolíticos o benzodiazepinas, somníferos, tranquilizantes, relajantes musculares o sedantes, o si bebe alcohol durante el tratamiento con BRIXADI®. El capuchón de la aguja BRIXADI® está fabricado con látex y puede causar sensibilidad en personas alérgicas al látex. BRIXADI® contiene soja, por lo que las personas alérgicas a la soja deben evitar este medicamento. En caso de emergencia, usted o su familia deben informar al personal médico de que está tomando BRIXADI®.

**Pregunte a su proveedor de atención médica sobre la naloxona (Narcan®), un medicamento que revierte una sobredosis de opiáceos.**

Este documento ha sido reproducido con permiso del Boston Medical Center y es un extracto de:

Loukas, V., Jodat, A., & LaBelle, C.T. (2024) *Buprenorphine Extended-Release Injection Implementation Guide*. Manual de tratamiento no publicado. Boston Medical Center.

Este manual o cualquiera de sus documentos no sustituyen la toma de decisiones médicas informadas por parte de un proveedor autorizado y adecuado.