



BRIXADI® Fich Edikasyon Pasyan an

Dokiman sa a bay enfòmasyon sou BRIXADI®, ki se yon preprasyon buprenorphine enjektab. Tanpri li l epi fè founisè w la konnen si w gen nenpòt kesyon.

Kisa BRIXADI® a ye, epi kijan I fonksyone? BRIXADI® se yon enjeksyon buprenorphine ki genyen yon efè ki dire lontan yo itilize pou trete twoub ki lye ak konsomasyon eksesif opyoïd yo. Enjeksyon sa disponib sou de fòm: Pa semèn epi pa mwa.

BRIXADI® pa semèn yo bay chak 7 jou	Dòz pa semèn 8mg, 16mg, 24mg, 32mg
BRIXADI® pa semèn yo bay chak 28 jou	Dòz pa mwa: 64mg, 96mg, 128mg

- BRIXADI® ba w yon semèn oswa tout yon mwa medikaman nan yon sèl enjeksyon pandan l ap kontinye ba w medikaman pandan semèn nan oswa mwa a nan yon nivo ki stab san monte ni desann. Ekip sante a ap detèmine avè w ki preparasyon ak ki dòz ki ap bon pou ou.

Kisa pou m fè avan m kòmanse pran BRIXADI®?

- Avan w kòmanse pran BRIXADI®, ou dwe ka sipòte omwen yon dòz 4 mg transmucosal buprenorphine OSWA w deja ap pran buprenorphine.
- Si w poko ap pran buprenorphine, w ap bezwen kòmanse pran BRIXADI® a yon fwa pa semèn.
- Si w ap pran buprenorphine deja, ou ka kòmanse ak yon tretman pa semèn oswa pa mwa avek BRIXADI®.
- Si se opyoïd w ap pran aktyèlman ou pap pran buprémorphine, mande founisè w la pou w kòmanse pran kapsil oswa konprime buprenorphine, pou evite yon mank avan lè avan w pran enjeksyon an.

Kòman m ap fè pran enjeksyon BRIXADI® mwen yo?

- Doktè w la ap ba w BRIXADI® sou fòm enjeksyon nan kò (anba po), nan dèyè, kuis, estomak (abdomèn) oswa nan pati siperyè bra w.
- Yo enjekte BRIXADI® sou fòm likid ki ap fòme yon mas sou po a yo rele depo. Pandan kèk semèn ou ka wè oswa santi yon boul anba po w kote yo te fè enjeksyon an, epi li ka vin pi piti aprè. Pa eseye retire depo a.

Ki efè segondè BRIXADI® ka genyen?

Tankou tout medikaman, BRIXADI® ka pwovoke efè segondè. Efè sekondè ki pi komen yo se:

- Tèt fè mal
- Konstipasyon
- Kè plen
- Twoub somèy (pa ka dòmi)
- Enfeksyon nan vwa irinè

Efè endezirab nan enjeksyon yo jeneralman yo fèb oswa modere. Kanmenm, tanpri kontakte ekip swen an kounya si w santi gwo doulè, iritasyon, chanzman sou po, oswa boule/gratèl kote yo te fè enjeksyon an, sa ka pèmèt nou fè yon evalyasyon ki ale pi lwen.

Kontakte ekip sante w la kounya si w panse w gen efè segondè ki grav, tankou difikilte pou respire, somnolans, tèt vire oswa pwoblem kowòdinasyon, pwoblem nan fwa (pipi fonse, po/je jòn, vant fè mal) alèji, mank opyoïd, oswa tansyon ba.

Ki enfòmasyon sekirite enpòtan m dwe konnen sou BRIXADI®?

Yo pa dwe janm enjekte BRIXADI® nan yon venn paske sa ka lakoz andomajman ki grav oswa menm lanmò. Pasyan yo pa dwe janm manipile medikaman sa a. Pran medikaman kont estrès oswa benzodiazepines, somnifè, trankilizan, relaksan miskilè, oswa sedatif, oswa konsome alkòl pandan tretman BRIXADI® a, ka lakoz lanmò oswa andomajman ki grav. Bouchon egwi BRIXADI® a fèt avèk latèks epi li ka pwovoke yon sansibilite lakay moun ki alèji ak latèks yo. BRIXADI® gen soja ladan, moun ki alèji ak soja yo dwe evite medikaman sa a. Si gen ijans, ou menm oswa fanmi w dwe enfòme pèsonèl medikal la ou ap pran BRIXADI®.

Mande founisè swen sante w la pou l pale w de naloxone (Narcan®) yon medikaman ki pèmèt ou jere yon ovèdoz opyoïd.

Dokiman sa a te repwodwi avèk otorizasyon Boston Medical Center epi li soti nan:

Loukas, V., Jodat, A., & LaBelle, C.T. (2024) *Buprenorphine Extended-Release Injection Implementation Guide*. Manyèl tretman ki pa pibliye.
Boston Medical Center.

Manyèl sa a oswa tout lòt dokiman ki gen ladan l yo pa ranplase yon desizyon medikal avize yon founisè kalifye pran.